

病害虫防除技術情報第12号

平成27年7月15日

三重県病害虫防除所

クワシロカイガラムシ第2世代幼虫を防除しましょう

1. 対象作物： チャ
2. 対象病害虫名： クワシロカイガラムシ第2世代幼虫
3. 発生状況

有効積算温度による第2世代幼虫孵化最盛予測日（7月14日予測）は、四日市では7月18日（平年7月21日）、亀山市では7月18日（平年7月21日）、松阪市飯南町粥見では7月21日（平年7月21日）と予想されます（表）。

県予察圃（亀山市:7月14日）では、産卵雌率66%、孵化卵塊率2%程度の状況です。

巡回調査圃場（7月第2週）では、雌成虫寄生株率24.1%（平年18.1%）と多い状況です。

4. 防除対策

- (1) 孵化最盛日から2日～4日後頃が防除適期です。枝幹につく歩行型幼虫を確認して防除しましょう。
- (2) この時期は土着天敵の活動が盛んになる時期ですので、天敵に影響の小さい薬剤を選択しましょう。

表 クワシロカイガラムシ第2世代幼虫孵化最盛予測日と防除適期(7月14日予測)

	孵化最盛予測日	平年比(日)	防除適期
四日市	7月18日	-3	7月20～22日
亀山	7月18日	-3	7月20～22日
粥見	7月21日	0	7月23～25日

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。