

病害虫防除技術情報第3号

平成27年4月21日

三重県病害虫防除所

茶園においてカンザワハダニが増えています。

1 対象作物: チャ

2 対象病害虫名: カンザワハダニ

3 発生状況

(1) 1か月予報(4月16日発表)によると、平年と同様に晴れの日が多く、気温は平年並の予想です。

(2) 県予察圃(亀山市:4月上旬)では、寄生葉率2.0%(平年5.0%)と少、寄生頭数0.03頭/葉(平年0.60頭/葉)と少ない状況です。

(3) 巡回調査圃場(4月第2週)では、旧葉における発生圃場率65.2%(平年33.0%)と多、寄生葉率9.9%(平年2.5%)と多、寄生頭数0.39頭/葉(平年0.09頭/葉)と多の状況です(表)。

(4) 一般圃場(4月)では、発生量は多い状況です。

表 巡回調査圃場(4月第2週)におけるカンザワハダニ発生状況

調査年	発生圃場率(%)	寄生葉率(%)	寄生頭数(頭/葉)
本年	65.2	9.9	0.39
平年(10年平均)	33.0	2.5	0.09

県全体平均。旧葉50葉調査。

4 防除対策

(1) 一番茶摘採後に防除するのが基本です。圃場を確認して、多発状況であれば防除しましょう。

(2) 葉裏に生息しているため、薬剤は丁寧に散布してください。

(3) 世代交代が早く、薬剤抵抗性を獲得しやすいため、同一系統薬剤の連用は避けてください。

(4) ケナガカブリダニやハダニアザミウマなどの土着天敵が活動している圃場では、これらに影響の小さい薬剤で防除して下さい。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。