

# 病虫害発生予察注意報第3号

平成 28 年 8 月 31 日  
三重県病虫害防除所

1. 対象作物 : ダイズ、野菜類(アブラナ科野菜など)、花き類(シクラメン、キクなど)
2. 対象病虫害名 : ハスモンヨトウ
3. 発生地域 : 県内全域
4. 発生時期 : 9月上旬~10月下旬
5. 予想発生量 : 多
6. 注意報発令の根拠

- (1) 県予察圃(松阪市嬉野川北町)におけるフェロモントラップ誘殺数は、7月第6半旬~8月第5半旬では663頭(平年347.9頭)と多い状況です(図)。
- (2) ダイズの巡回調査圃場(8月第1週)では、葉食害度0.8(平年0.1)、1a当り白変か所数2.6か所(平年0.2か所)と多い状況でした。
- (3) 1か月予報(8月25日・名古屋地方気象台発表)によると、気温は平年に比べ高い予想です。ハスモンヨトウの増殖に助長的です。




図. フェロモントラップによるハスモンヨトウ成虫の誘殺消長  
(調査場所: 松阪市嬉野川北町)

## 7. 防除上の注意事項

- (1) 老齢になるに従って薬剤の効果が劣ります。若齢幼虫のうちに防除してください。
- (2) 多発すると被害が分散し、防除が困難になるので、早期防除に努めてください。
- (3) 施設では、施設内に産卵させないように開口部に防虫ネットを張るなど、成虫の侵入を防止してください。
- (4) ダイズでは、圃場をこまめに見回り、白変葉(若齢幼虫群の食害によるカスリ状となった葉)等の発生に注意を払い、初期防除に努めてください。
- (5) 野菜類や花き類では、圃場をこまめに見回って早期発見に努め、速やかに防除してください。
- (6) 画像等の参照先 : <http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650033.pdf>

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください！