

病害虫防除技術情報第 2 号

平成 30 年 4 月 6 日

三重県病害虫防除所

**コムギの出穂が予測より早まっています！
赤かび病の防除時期をご注意ください！**

1. 対象作物：コムギ
2. 対象病害虫名：コムギ赤かび病
3. 生育状況

4 月 6 日巡回調査(松阪市藤之木、多気町兄国)において、11 月上旬播種コムギの出穂開始を確認しました。技術情報第 1 号で行った出穂期予測日(11 月 10 日播種 伊勢平野部 あやひかり)で出穂期 4 月 16 日)より、出穂期が早くなります。

(1) 本年は 3 月以降の高温により、予測(生育予測システム ver2.2)した防除適期に比較して、実際の防除適期は早くなると思われます。圃場の出穂・開花状況を観察して防除時期を決定してください。

(2) 防除適期は開花始めから開花盛期です。

コムギの開花は出穂期の約 7~10 日後です。開花の 3 日前を開花始期とし、開花始期から 10 日間を防除適期とします。開花前の薬剤散布は防除効果が劣ります。



図 4 月 6 日松阪市藤之木に於いてコムギ(11 月 10 日播種 あやひかり)の出穂が開始

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。