

平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査表

第24回

調査日：平成31年3月13日

| 漁場名 | | 採水時刻 | 水温 | | 比重 | | DIN(μg/L) | | PO4-P(μg/L) | |
|------|---------|------|------|------|------|------|-----------|------|-------------|------|
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| | | | | 3月6日 | | 3月6日 | | 3月6日 | | 3月6日 |
| 桑名 | 木曾岬 | | - | 10.7 | - | 23.3 | - | 154 | - | 14 |
| | 伊曾島(温泉) | 8:07 | 9.9 | 9.6 | 5.9 | 17.8 | 532 | 243 | 18 | 19 |
| | 伊曾島(新田) | 8:00 | 9.7 | 9.2 | 18.8 | 22.6 | 207 | 97 | 8 | 14 |
| | 城南 | | - | 11.8 | - | 22.6 | - | 90 | - | 14 |
| 鈴鹿 | 下箕田 | 8:30 | 10.8 | 10.0 | 18.7 | 22.3 | 194 | 92 | 12 | 3 |
| | 浜田 | 8:00 | 10.7 | 10.0 | 23.1 | 23.5 | 29 | 10 | 9 | 1 |
| | 白子 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 津市 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松阪 | 大口 | | 9.5 | 9.1 | 13.3 | 17.8 | 899 | 387 | 31 | 36 |
| | 東黒部 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊勢湾 | 下御糸 | | - | 10.0 | - | 23.1 | - | 78 | - | 6 |
| | 大淀 | | - | 10.0 | - | 22.4 | - | 51 | - | 2 |
| | 今一色(台場) | 7:30 | 11.1 | 10.1 | 23.2 | 22.7 | 68 | 16 | 3 | 1 |
| | 今一色(八幡) | 7:30 | 11.1 | 10.1 | 23.5 | 23.2 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 鳥羽磯部 | 桃取町 | | 10.2 | 10.5 | 23.5 | 23.4 | 20 | 3 | 1 | 1 |
| | 大答志 | | 11.2 | 9.8 | 24.0 | 23.9 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| | 答志上手 | | 11.0 | 9.8 | 23.5 | 24.0 | 41 | 8 | 2 | 0 |
| | 菅島(表) | | 11.3 | 10.6 | 23.9 | 24.2 | 35 | 24 | 0 | 2 |
| | 菅島(裏) | | 12.5 | 11.4 | 24.9 | 24.7 | 47 | 58 | 4 | 4 |
| | 安楽島 | | - | - | - | - | - | - | - | - |

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量

※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測

【ノリの生育条件】

| | 水温 | 比重 | DIN(μg/L) | PO4-P(μg/L) |
|------|-------|-------|-----------|-------------|
| 好適条件 | 8~13 | 15~24 | 100~400 | 15~50 |
| 最適条件 | 10~13 | 20~22 | 200 | 30 |

| | |
|----|--|
| 概況 | 白子港の水温、比重は平年並となっています。現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。潮位は、潮位図に比べて+2 ~ +48cmで推移しています。今後の動向に注意してください。 |
|----|--|

| | |
|----|---|
| 桑名 | 栄養塩量は、十分量です。 |
| 鈴鹿 | 栄養塩量は、浜田で少なくなっています。 |
| 中勢 | 栄養塩量は、十分量です。 |
| 南勢 | 栄養塩量は、今一色(台場)でやや少なく、今一色(八幡)で極端に少なくなっています。 |
| 鳥羽 | 栄養塩量は、少なくなっています。 |

☆栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。

【パソコンの場合】鈴鹿水産研究室 <http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm>

【携帯電話の場合】 <http://osakana-mie.com/producer/phone.cgi>

上記アドレスをbookmark登録してご利用頂くか、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。


*機種によっては利用できない場合があります。




平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査(水温・比重・潮位データ)

第24回

水温




比重



名古屋港の潮位偏差(速報値)

3 月



気象庁 潮汐観測資料より

潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差
 プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。

平成30年度

ノリ漁場プランクトン調査

三重県水産研究所
鈴鹿水産研究室
TEL 059-386-0163
三重県黒のり養殖研究会
TEL 059-228-1205

第24回

検鏡日： 平成31年3月13日
(cells/ml)

| 採水 | 漁協名 | キートセロス 属 | スケルトネマ 属 | シュドニッチア 属 | リゾソレニア 属 | タラシオンシーラ 属 | セラチウム 属 | その他の 藻類 |
|-------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 欠 | 木曾岬 | | | | | | | |
| 3月12日 | 伊曾島(温泉) | | 40 | | | | | |
| 3月12日 | 伊曾島(新田) | | 2,950 | | | | | |
| 欠 | 城南 | | | | | | | |
| 3月13日 | 鈴鹿市 | 下箕田 | 1880 | | | | | |
| 3月12日 | | 浜田 | 400 | | | | | |
| 欠 | | 白子 | | | | | | |
| 欠 | 津市 | | | | | | | |
| 3月12日 | 松阪 | 大口 | 30 | | | | | |
| 欠 | | 東黒部 | | | | | | |
| 欠 | 下御糸 | | | | | | | |
| 欠 | 大淀 | | | | | | | |
| 3月12日 | 今一色(台場) | | | | | | | |
| 3月12日 | 今一色(八幡) | | 90 | | | | | |
| 3月12日 | 桃取 | | 40 | | | | | |
| 3月12日 | 大答志 | | | | | | | |
| 3月12日 | 答志上手 | | | | | | | |
| 3月12日 | 菅島 | 表 | | | | | | |
| 3月12日 | | 裏 | | | | | | |
| 欠 | 安楽島 | | | | | | | |

現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。今後の動向に注意してください。