

平成22年度 黒のり漁場栄養塩調査表

第 1 9 回

調査日：平成23年2月2日

漁場名	採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)		
			(前回)		(前回)		(前回)		(前回)	
桑名	木曾岬	4:00	8.6	9.6	23.2	22.8	233	268	18	19
	伊曾島(温泉)	8:00	5.7	8.5	15.3	20.6	343	243	21	27
	伊曾島(新田)	8:05	7.5	9.1	23.5	22.8	114	191	17	19
	城南		7.7	9.5	23.0	22.9	127	149	14	18
鈴鹿	下箕田		6.7	7.8	23.8	23.1	80	96	13	14
	山中									
	浜田		7.2	8.3	23.7	23.2	230	266	127	127
	原永		5.8	7.9	23.6	23.4	32	59	9	15
	白子		6.5	8.0	23.7	23.3	58	103	11	14
津市		6.6	7.9	23.8	23.4	75	100	11	16	
松阪	大口		5.7	7.2	22.8	23.2	176	144	20	27
伊勢湾	下御糸		7	6.9	23.8	23.4	67	54	8	38
	大淀		6.5	6.0	23.3	23.0	92	60	11	12
	東大淀		5	6.0	23.6	17.3	68	507	10	14
	今一色		5.6	7.0	23.5	23.0	57	61	8	28
鳥羽磯部	桃取町	8:00	5.5	7.2	24.0	23.8	74	71	11	12
	大答志		8.3	8.3	24.7	24.2	106	94	21	17
	答志上手		7	7.2	24.2	23.8	87	51	14	13
	坂手	8:30	8.2	8.2	24.4	24.0	77	74	14	20
	菅島(表)		8.4	8.1	24.5	24.0	76	70	13	12
	菅島(裏)			10.4		24.8		93		17
	安楽島		8.5	8.8	25.0	24.1	105	69	18	14

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素

※PO4-P…リン酸態リン

【ノリの生育条件】

	水温	比重	DIN(μg/L)	PO4-P(μg/L)
好適条件	8~13	15~24	100~400	15~50
最適条件	10~13	20~22	200	30

概況	漁場の水温は5.0~8.6℃です。白子港の水温は平年よりかなり低めで推移しています。比重は平年より高めで推移しています。現在、黒ノリ養殖漁場ではプランクトンは発生していません。潮位は、潮位図に比べて-9~-0cmで推移しています(2日午前9時現在で0cm)。
----	---

桑名	栄養塩量は十分量です。
鈴鹿	栄養塩量は白子、原永で少なくなっています。
中勢	栄養塩量は津市でやや少なくなっています。
南勢	栄養塩量は下御糸・大淀・今一色でやや少なくなっています。
鳥羽	栄養塩量はほぼ十分量です。

★栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。

【パソコンの場合】鈴鹿水産研究室 <http://www.mpstpc.pref.mie.jp/SUI/suzuka/jouhou/nori/index.htm>

【携帯電話の場合】 http://www.miegyoren.or.jp/cgi-bin/mie_gyo/user/phone.cgi

上記アドレスをbookmark登録してご利用頂くか、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。


*機種によっては利用できない場合があります。



平成22年度 黒のり漁場栄養塩調査(水温・比重・潮位データ)


第19回

白子地先の水温と比重の推移



名古屋港の潮位偏差(速報値)

2 月



気象庁 潮汐観測資料より

潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差
 プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。

平成22年度

ノリ漁場プランクトン調査

三重県水産研究所
鈴鹿水産研究室
TEL 059-386-0163
三重県黒のり養殖研究会
TEL 059-228-1550

第19回

調査日： 平成23年2月2日
検鏡日： 平成23年2月2日

(cells/ml)

採水	漁協名	キートセロス	スケルトネマ	ニッチア	リゾソレニア	タラシオシーラ	セラチウム	その他の
		sp.	コストム	ブンゲンス	sp.	sp.	フルカ	藻類
2月1日	木曾岬							
2月1日	伊曾島(温泉)							
2月1日	伊曾島(新田)							
2月1日	城南							
2月1日	鈴鹿市	下箕田						
欠		山中						
2月1日		浜田						
2月1日		原永						
2月1日		白子						
2月1日	津市							
2月1日	松阪	大口						
2月1日	下御糸							
2月1日	大淀							
2月1日	東大淀							
2月1日	今一色							
2月1日	桃取							
2月1日	大答志							
2月1日	答志上手							
2月1日	坂手							
2月1日	菅島	表						
欠		裏						
2月1日	安楽島							

現在、黒ノリ養殖漁場ではプランクトンは発生していません。