

防疫措置の手引き

CSF感染確認区域で狩猟をした場合は、イノシシを捕獲しなかった場合でも現場を離れるとき(砂利道などの未舗装路から舗装路などに出る場合)は、靴の底やタイヤの泥や落ち葉等をブラシ等で取り除いていから、消毒液を噴霧してください。

手元の消毒 : アルコール消毒

器具や猟犬及び車両などの消毒 : 逆性石けん液(ベンザルコニウム塩化物)

<手順の一例>

手押しポンプ 4ℓ ※ホームセンター等で購入可能

オスバンS 500 ml ※薬局等で購入可能

器具等の消毒(噴霧・清拭・浸漬) 50~200 倍

猟犬の消毒(噴霧) 400~1,000 倍

消毒液原液 500 mlサイズのボトルのキャップで約5 ml

アルコール消毒ポンプ

消毒用エタノール 500 ml ※薬局等で購入可能

器具や車両の消毒

消毒液(オスバンS)のキャップに原液を4杯(5 ml×4杯=20 ml)、水4ℓで希釈濃度200倍になります。

わなや猟犬に使用したリード等を消毒する。

車両のタイヤとタイヤハウス内は、ブラシ等で土や汚れを落とします。

車両で土や汚れが付いた部分を中心に消毒薬を噴霧器で消毒します。

猟犬の消毒

ポンプ(4ℓ)内の消毒薬残量が約半分になったところで、水を2ℓ足せば希釈濃度400倍になります。

犬の体表及び足裏の汚れ等をブラシ等で十分に落とし、足裏を噴霧器で消毒します。体表の消毒ができない場合は、水洗い後の地面を消毒します。

手元等の消毒

靴は、噴霧器で消毒。手元や車内は、アルコールスプレーで消毒する。

主な逆性石けんの市販製剤と希釈濃度

薬剤商品名	器具等の消毒	猟犬の消毒
オスバンS	50~200 倍	400~1,000 倍
パコマ	50~400 倍	500~2,000 倍
アストップ	1,000~6,000 倍	1,000~6,000 倍

消毒機材など



消毒液（オスバンS）と噴霧器（4ℓ）



スプレーを取付けた消毒用アルコール



靴底やタイヤの洗浄に使用するブラシ



車両の消毒（タイヤとタイヤハウス）



足元の消毒