



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- ・ 鳥羽市管内、的矢湾、英虞湾ともに水深3mの水温は前回より低下し10~14℃台となりました。
- ・ 的矢の表層では、高水温（16.8℃）と高い塩分（34.7）が観測されており、外洋水の影響を強く受けていると思われます。
- ・ 珪藻類は、前回と同様に少ない状態です。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	12/21							12/22		12/21
時刻	9:02	9:22	9:42	9:52	16:04	16:13	16:22	10:35	10:15	10:25
水深 (m)	20.9	10.0	17.4	26.4	9.2	8.5	10.5	10.5	9.6	5.5
水温 (°C) 0.5m	12.0	11.8	14.1	15.3	14.0	13.9	14.1	16.8	12.3	10.6
3m	12.0	11.9	14.4	15.4	14.0	14.0	14.1	14.6	13.3	10.7
5m	12.0	11.9	14.6	15.4	14.1	14.0	14.1	13.1	14.1	10.7
塩分 0.5m	26.2	29.6	29.9	30.3	30.0	30.3	30.5	34.7	33.9	33.7
3m	28.1	29.5	30.2	30.5	30.3	30.5	30.6	34.3	34.2	33.7
5m	28.4	29.5	30.3	30.6	30.3	30.5	30.7	34.1	34.4	33.7
溶存酸素量 0.5m	9.0	9.1	8.6	8.5	8.5	8.7	8.6	7.8	8.8	9.0
(mg/l) 3m	9.0	9.0	8.4	8.2	8.6	8.6	8.5	8.3	8.7	9.0
5m	9.0	8.9	8.3	8.2	8.6	8.6	8.5	8.6	8.4	9.0
珪藻類 (細胞/ml)										
・ 水深3mの細胞数	120	240	40	240	290	70	90	20	80	110
・ 二枚貝の餌になる										

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項：三重県真珠養殖関係漁場水温モニタリングシステムのデータから、的矢湾の外洋水の影響は現在も継続している模様です。<http://www.ohyamanet.info/~m-shinkyomatoyawan.php>