

緊急



# 水田たより

令和2年7月6日

桑名地域農業改良普及センター 馬場、大野、鷲野、西山 (TEL:0594-24-3641)

## ニカメイチュウが多発しています！

### 発生量は過去最多水準



いなべ市や東員町のほぼ全域で確認されています。  
特に、山林や休耕田等の越冬地がある場所で、集中的に発生しています。  
桑名市や木曾岬町での発生は少ないですが、今後に向けて注意が必要です。  
業務用米や飼料用米だけでなく、早生品種(コシカ等)でも発生しています。

## 防除のポイント

ニカメイチュウ対策は、**殺虫剤の散布が有効**です！

散布適期

早生(コシカ, 千石加) 7月中旬～下旬 (斑点米かみしにも有効)  
業務用米, 飼料用米 7月下旬～8月上旬

「ニカメイチュウ」に登録のある殺虫剤の例 (令和2年7月1日時点)

薬剤名	散布量	希釈倍数	使用時期
スタークル粒剤	3kg/10a	—	収穫7日前まで
ダントツ粒剤	3kg/10a	—	収穫7日前まで
スミチオン乳剤	60～150L/10a	800～1000倍 (第2世代)	収穫21日前まで

農薬の使用にあたっては、ラベルに記載された内容を十分に確認してください。