

病害虫防除技術情報第 14 号

令和 3 年 9 月 8 日

三重県病害虫防除所

**トビイロウンカの飛来が続いています。
引き続き被害の発生に注意しましょう。**

1. 対象作物 : 水稻（普通期）

2. 対象病害虫名 : トビイロウンカ

3. 発生状況

(1) 8 月第 1～6 半旬の予察灯（60W 白熱灯）の誘殺数は、松阪市で 13 頭（過去 10 年平均 2.1 頭、以下同じ）、紀北町で 111 頭（3.0 頭）、御浜町で 7 頭（1.9 頭）、伊賀市第 2～5 半旬で 17 頭（3.7 頭）といずれも平年より多い状況です（表）。

(2) 1 か月予報（名古屋地方気象台 9 月 2 日発表）によると、気温は期間の第 1 週では平年並～低いものの、第 2 週以降は平年並～高いことから、トビイロウンカの活動に好適な状況は続く予想されます。

4. 防除対策

(1) 株元でトビイロウンカが 1 株に 1 頭以上確認される場合、坪枯れもしくは坪状の黄化症状が認められる場合には、防除対策が必要です。

(2) 薬剤による防除を行う場合は、収穫期にあたるため周辺の圃場への飛散がないように、また、収穫前日数に留意するなど安全使用基準を遵守してください。薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。<https://www.nouyaku.sys.com/nouyaku/user/top/mie>

(3) 本種は株元に生息するので、液剤・粉剤を散布する場合は株元に十分かかるよう散布してください。

(4) 収穫時期が近づいている場合は、適期の範囲内で早めに収穫し、刈り遅れによる被害拡大を防ぎましょう。

表 予察灯（60W 白熱灯）におけるトビイロウンカの誘殺数

月. 半旬	松阪	伊賀	紀北	御浜
8. 1	0	欠測	17	1
8. 2	1	3	28	0
8. 3	1	9	27	2
8. 4	2	0	15	0
8. 5	4	5	15	0
8. 6	5	調査中	9	4
期間計	13	17	111	7
期間平年 (10年平均)	2.1	3.7	3.0	1.9

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。