



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深3mの日平均水温は10月中旬から下旬にかけて低下し、10月末時点で20~21℃台となりました。
- 10月8日（英虞湾）および10日（的矢湾）の観測では、表層から水深5mまで、水温が20℃を下回り19℃台となりました。
- 珪藻類はすべての観測点で減少しました。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	11/4							11/10		11/8
時刻	13:24	13:55	14:11	14:26	14:40	14:54	15:12	13:55	13:30	10:34
水深 (m)	19.9	9.7	16.5	17.0	9.5	9.0	10.9	14.4	8.7	5.7
水温 (°C) 0.5m	20.0	20.5	20.6	21.1	20.7	20.7	20.7	19.6	19.4	19.3
3m	20.0	20.4	20.8	21.1	20.7	20.7	20.7	19.8	19.7	19.3
5m	20.0	20.4	20.9	21.1	20.7	20.7	20.7	19.9	19.8	*19.4
塩分 0.5m	28.3	30.3	29.9	30.2	30.2	30.1	30.0	32.0	31.7	32.4
3m	29.3	30.1	30.1	30.2	30.1	30.0	30.0	32.6	32.5	32.4
5m	29.3	29.9	30.1	30.2	30.1	30.0	30.0	32.7	32.6	*32.4
溶存酸素量 0.5m (mg/l)	7.7	7.8	7.7	7.6	7.9	7.8	7.9	7.4	8.4	6.7
3m	7.7	7.7	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	7.3	7.0	6.8
5m	7.7	7.7	7.6	7.5	7.9	7.8	7.9	7.2	6.8	*6.8
珪藻類(細胞/ml) ・水深3mの細胞数 ・二枚貝の餌になる	60	340	280	180	135	135	325	30	30	40

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項：神明は水深5.7mのため、水深4.7mの観測値を水深5m欄に記載しています。