

病害虫防除技術情報第5号

令和5年7月3日
三重県病害虫防除所

**クワシロカイガラムシ第2世代幼虫の発生時期はやや早～早です。
適期防除に努めましょう。**

1. 対象作物： チャ
2. 対象病害虫名： クワシロカイガラムシ第2世代幼虫
3. 発生状況
 - (1) 巡回調査圃場（6月第1週）では、雌寄生株率7.4%（平年7.5%）と平年並、雄繭発生株率13.1%（平年11.7%）とやや多い状況です。
 - (2) 有効積算温度による第2世代幼虫孵化最盛予測日（6月28日予測）は、四日市市水沢町では7月16日（平年7月18日）、亀山市椿世町では7月12日（平年7月18日）、松阪市飯南町粥見では7月14日（平年7月21日）とやや早～早と予想されます（表）。
4. 防除対策
 - (1) 孵化最盛日から2日～4日後頃が防除適期です。枝幹につく歩行型幼虫を確認して防除してください。
 - (2) この時期は土着天敵の活動が盛んになる時期です。天敵に対し影響の小さい薬剤を選択してください。

表 クワシロカイガラムシ第2世代幼虫孵化最盛予測日と防除適期(6月28日予測)

	孵化最盛予測日	平年比(日)	防除適期
水沢町 (四日市市)	7月16日	-2	7月18～20日
椿世町 (亀山市)	7月12日	-6	7月14～16日
粥見 (松阪市)	7月14日	-7	7月16～18日

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。