

病害虫防除技術情報第6号

令和5年8月4日
三重県病害虫防除所

シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺数が急増しています

1. 対象作物：ネギ
2. 対象病害虫名： シロイチモジヨトウ
3. 発生状況と気象の状況
 - 1) 県予察圃（松阪市嬉野川北町）におけるフェロモントラップ誘殺数（7月第1半旬～第6半旬）は69頭（平年44.9頭）と多い状況です（図）。
 - 2) 1か月予報（8月3日・名古屋地方気象台発表）によると、向こう1か月の気温は高く、降水量はほぼ平年並の見込みです。このため、シロイチモジヨトウの発生に好適条件が続くと考えられます。




図 フェロモントラップによるシロイチモジヨトウ成虫の誘殺消長
(調査場所三重県松阪市嬉野川北町)

シロイチモジヨトウ幼虫

4. 防除対策

- 1) こまめにほ場を見回り、白く透けて垂れ下がった葉を探すなどして発生初期の防除に努めてください。
- 2) 老齢になるにしたがって薬剤の効果が低下するので、若齢のうちに防除してください。
- 3) シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺状況は、以下の野菜の病害虫のページにて随時更新しています。
(<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39619007432.htm>)
- 4) 防除薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。
(<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/mie>)

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。