

病害虫防除技術情報第8号

令和5年8月22日
三重県病害虫防除所

シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺数が増え続けています

1. 対象作物：ネギ
2. 対象病害虫名： シロイチモジヨトウ
3. 発生状況と気象の状況
 - 1) 県予察圃（松阪市嬉野川北町）におけるフェロモントラップ誘殺数（7月第5半旬～8月第4半旬）は192頭（平年73.6頭）と過去10年と比較して最も多い状況です（図）。
 - 2) 巡回調査圃場（8月第1～第2週）では、青ネギの被害株率3.1%（平年0.3%）と過去10年と比較して最も多い状況です。




図 フェロモントラップによる
シロイチモジヨトウ成虫の誘殺消長
(調査場所三重県松阪市嬉野川北町)

シロイチモジヨトウ幼虫

4. 防除対策

- 1) こまめにほ場を見回り、白く透けて垂れ下がった葉を探すなどして発生初期の防除に努めてください。
- 2) 老齢になるにしたがって薬剤の効果が低下するので、若齢のうちに防除してください。
- 3) シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺状況は、以下の野菜の病害虫のページにて随時更新しています。
(<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39619007432.htm>)
- 4) 防除薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。
(<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/mie>)

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。