

# 病害虫発生予察注意報第7号

令和5年10月16日

三重県病害虫防除所

## オオタバコガの発生が非常に多い状況です。

- 1 対象作物：野菜類(トマト、アブラナ科野菜、イチゴ、ネギなど)、花き
- 2 対象病害虫名：オオタバコガ
- 3 発生地域：県内全域
- 4 予想発生量：多
- 5 注意報発令の根拠

(1) 冬キャベツと秋冬ハクサイの巡回調査ほ場(10月第1～2週)では、発生圃場率は26%でした。

(2) フェロモントラップにおける誘殺数は、松阪市嬉野川北町(9月第3半旬～10月第2半旬)で519頭(平年84頭)と多い状況です(図1)。

(3) 1か月予報(10月12日・名古屋地方気象台発表)によると、向こう1か月の気温は高く降水量は少ない見込みです。このため、オオタバコガの発生に好適な条件が続くと考えられます。




図1 オオタバコガ成虫の誘殺消長



図2 オオタバコガ幼虫



図3 食入されたキャベツの結球

## 6 防除上の注意事項

- (1) 植物内部に食入した幼虫に対しては、ほとんど効果は期待できません。こまめには場を観察して、発生初期の防除に努めてください(図2・図3)。
- (2) 幼虫が植物の成長点、蕾、果実などに食入し、食べ尽くすと次々にわたり歩くため、数が少なくても、被害は大きいです(図2・図3)。
- (3) 薬剤の効果が高い若齢のうちに防除してください。
- (4) 薬剤は葉裏や株全体に散布ムラがないように丁寧に散布してください。
- (5) 薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布してください。
- (6) 防除薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。  
(<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/mie>)
- (7) オオタバコガのフェロモントラップ誘殺状況は、以下の野菜の病害虫のページにて随時更新しています。  
(<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39619007432.htm>)

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。