

# 病害虫防除技術情報第9号

令和6年7月5日  
三重県病害虫防除所

## クワシロカイガラムシの第二世代幼虫を防除しましょう。

- 1 対象作物 : チャ
- 2 対象病害虫名 : クワシロカイガラムシ 第二世代幼虫
- 3 孵化最盛期 : やや早 (第一世代が5/10の場合、第二世代が7/12と予測されます。)
- 4 発生状況 : やや少

7月1日、2日巡回調査結果：第一世代オス繭寄生株率3% (平年9%)、雌成虫寄生株率1% (平年7%)

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	平年値 (平成25年～令和4年)
第一世代	5月10日	5月12日	5月13日	5月14日	5月18日	5月15日
第二世代	7月12日 (予測)	7月14日	7月22日	7月16日	7月17日	7月17日

	亀山市椿世町		四日市市水沢町		松阪市飯南町粥見	
第二世代	7月12日 (予測)	平年7月17日	7月16日 (予測)	平年7月18日	7月12日 (予測)	平年7月20日

有効積算温度による第二世代幼虫孵化最盛予測日は、亀山市では7月12日 (平年7月17日) と予想されます。第一世代の孵化最盛期の実測や、今後の気温は高めの予報が出ていることから、第二世代もやや早めの孵化が予想されます。

## 5 防除対策

- 1) 防除適期は孵化最盛期です。

地域により孵化時期は異なるので、枝幹につく歩行型幼虫を確認して防除してください。

- 2) 防除の際には、隣接ほ場へのドリフトに十分注意してください。

- 3) 薬液が枝幹に充分かかるよう専用ノズル等で丁寧に散布して下さい。

二番茶の浅刈りせん枝後の防除は薬液が枝にかかりやすく、効果的です。

農薬は必ずラベルの表示を確認し、使用方法を守り使いましょう。