

病害虫防除技術情報第4号

令和7年7月2日
三重県病害虫防除所

オオタバコガのフェロモントラップ誘殺数が急増しています。

1 対象作物：花き類・野菜類

2 対象病害虫名：オオタバコガ

3 発生状況と気象の状況

(1) フェロモントラップ（松阪市）における4月1日から6月末までの誘殺数は、362頭（平年45.6頭）となっており、平年の約8倍、昨年度同時期（171頭）の約2倍で、この時期としては平成11年の調査開始以来最も多い状況です（図1および図2）。

(2) 1か月予報（6月28日・名古屋地方気象台発表）によると、向こう1か月の気温は高い見込みで、オオタバコガの発生に好適条件が続くと考えられます。




図1. 過去10年間との比較（松阪市）
4月～6月誘殺数計




図2. フェロモントラップ（松阪市）におけるオオタバコガ誘殺数推移

4 防除対策

- (1) 植物内部に食入した幼虫に対しては、農薬の効果はほとんど期待できません。こまめには場を観察して、発生初期の防除に努めてください。
- (2) 幼虫が植物の成長点、蕾、果実などに食入し、食べ尽くすと次々にわたり歩くため、数が少なくても、被害は大きいです（図3）。



図3 a オオタバコガ若齢幼虫 b オオタバコガ終齢幼虫 c トルコギキョウの被害
体の色や刺毛(トゲ)の基部の色には変異がありますが、刺毛や体節は比較的顕著です。

- (3) 薬剤の効果が高い若齢のうちに防除してください。
- (4) 薬剤は葉裏や株全体に散布ムラがないように丁寧に散布してください。
- (5) 成虫の産卵防止対策には性フェロモン剤（交信かく乱剤）を利用する方法もあります。
- (6) 防除薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。
- (7) オオタバコガのフェロモントラップ誘殺状況は、以下の野菜の病害虫のページにて随時更新しています。

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/mie>

<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39619007432.htm>

農薬は必ずラベルの表示を確認し、使用方法を守って使いましょう。

予報発行時の e メール連絡サービス(病害虫情報メール)の登録はこちら→

